

定期予防接種

予防接種法で定められている定期予防接種は、対象年齢内、対象期間内で接種する場合、公費負担で接種ができます。接種期間、接種対象年齢を過ぎると任意接種となり接種費用も本人負担となります。

接種される際は、予防接種の効果・副反応を理解したうえで接種しましょう。

また、母子健康手帳等で接種履歴を確認し、接種していないものがありましたら、早い時期に接種をしましょう。



不活化ポリオ予防接種が開始されました

平成24年9月1日からポリオワクチンの定期予防接種の接種方法等が変更されました。

生ポリオワクチンから、不活化ポリオワクチンに一律に切り替わっています。

◆対象者
生後3か月～7歳6か月に至るまでの間にある方

※その他詳細については、健康づくり推進室までお問い合わせください。

四種混合予防接種が開始されました

平成24年11月1日から四種混合ワクチンの定期予防接種が開始されました。

「三種混合」「ポリオ」予防接種を1度も受けていない方は、四種混合ワクチンの対象となります。

| 予防接種の種類 | 対象者 | 接種方法 |
|--|------------------------|--|
| 四種混合ワクチン (ジフテリア 百日せき 破傷風 不活化ポリオ) | 生後3か月～7歳6か月に至るまでの間にある方 | 初回3回、追加1回の計4回接種【接種間隔】 間隔を守って接種してください。 初回：20日～56日の間隔で接種 |

1すでに「生ポリオワクチン」または、「不活化ポリオワクチン」、「三種混合ワクチン」を1回以上接種している方は、「三種混合ワクチン」と「不活化ポリオワクチン」で接種を進めてください。

MR(麻しん風しん)予防接種

定期予防接種として実施している麻しん風しん(MR)予防接種は、2期は平成18年度から、3期・4期は平成20年度から2回接種になっています。今年度でMR3期・4期は終了となります。(乳幼児期に麻しん1回、風しん1回接種された方も、MRワクチンの接種対象となります)

接種期間が残り3か月余りとなります。早めに接種をしましょう。

※MRワクチンとは：

麻しん、風しんワクチンが混合されており、1回の接種で2つの免疫が獲得できます。麻しん風しんウイルスは、空気感染によっておこり、とても感染力が強いウイルスです。昨年からは福岡県内で風しんにかかった方が多く報告されています。

免疫を持たないと大人になってもかかるとか、大人になってかかると重症になるため、男女ともに必要な予防接種となります。また女性には、将来妊娠した時、妊娠初期に風しんにかかると胎児に影響することもあります。

任意予防接種

国のワクチン接種緊急促進事業で任意予防接種に分類されている、左記予防接種において、保護者が接種を希望される場合に公費負担で接種することができます。

なお、接種の際は、接種間隔を守って接種してください。接種間隔を守って接種できなかった場合は、公費負担の対象となりませんので、ご注意ください。接種の際は、母子健康手帳をご持参ください。

◆接種期間
平成24年4月1日～平成25年3月31日

◆接種対象者

| 予防接種の種類 | 接種対象者 |
|-------------|---|
| 子宮頸がん予防ワクチン | ・平成8年4月2日～平成12年4月1日生まれの女子 ・平成7年4月2日～平成8年4月1日生まれで、平成24年3月31日までに1回以上接種している女子 |
| ヒブワクチン | ・生後2か月～5歳未満(5歳の誕生日の前々日まで) ※接種年齢により接種回数異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
| 小児用肺炎球菌ワクチン | |

接種期間

| 予防接種の種類 | 接種対象者 |
|-----------------------|--------------------------|
| MR2期 (平成25年度小学1年生) | 平成18年4月2日～平成19年4月1日生まれの方 |
| MR3期 (中学1年生の年齢相当) | 平成11年4月2日～平成12年4月1日生まれの方 |
| MR4期 (高校3年生の年齢相当) | 平成6年4月2日～平成7年4月1日生まれの方 |

※右記対象者、接種期間内は、接種費用は公費負担となります。接種期間を過ぎると接種費用は本人負担となります。

町内実施医療機関

| 医療機関名 | 電話番号 | 定期予防接種 | | | | | | | 任意予防接種 | | |
|--------------|----------|----------|-----|------|------|----|------|----------|----------|----|---------|
| | | 四種混合 | ポリオ | 三種混合 | 二種混合 | MR | 日本脳炎 | BCG(要予約) | 子宮頸がん予防 | ヒブ | 小児用肺炎球菌 |
| いりえ小児科医院 | 932-9600 | ○ 要予約 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 要予約 | ○ | ○ | ○ |
| うみ小児科医院(要予約) | 410-8766 | ○ 全て要予約 | | | | | | | ○ 全て要予約 | | |
| おかべ小児科クリニック | 933-7161 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 要予約 | ○ | ○ | ○ |
| 岡部病院(要予約) | 932-0025 | ○ 全て要予約 | | | | | | | ○ 全て要予約 | | |
| おがわクリニック | 933-0758 | × | × | × | × | × | × | × | ○ 要予約 | × | × |
| 神武医院 | 932-0188 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 要予約 | ○ 要予約 | ○ | ○ |
| 中西内科クリニック | 934-0703 | × | × | × | × | × | × | ○ 要予約 | ○ 要予約 | × | × |
| 山崎産婦人科・小児科医院 | 933-8000 | ○ 要予約 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 要予約 | ○ 要予約 | ○ | ○ |

知っていますか？
たばこの煙が
おなかの赤ちゃんに
与える影響について

喫煙者が吸う主流煙、喫煙者から吐き出された呼出煙、火のついたたばこから発生する副流煙、衣服や喫煙室に残った残留有害物質等を喫煙者の周囲にいる人が吸い込むことを「受動喫煙」と言います。

たばこの主成分であるニコチンは交感神経を刺激し、末梢の血管を収縮させる作用があり、妊婦の周囲で家族が喫煙していることと胎盤から胎児へ酸素が十分に供給されず、流産や早産、低出生体重児が生まれる可能性が高くなります。

日本の男性の喫煙率は先進諸国の中で最も多く、また、女性の喫煙者数も著しく増加しています。

平成24年4月～10月の間に宇美町で母子健康手帳を交付した妊婦さんの6割の同居家族に喫煙者がいることが分かれました。たばこの煙は将来を担う子ども達の成長・発達に重大な影響を及ぼします。

家族全員の健康問題として考えてみてはいかがでしょうか。